

市区町別特定健診リスク因子マップ

（健診マップ）



広島県保険者協議会

目 次

1	市区町別特定健診リスク因子マップ（健診マップ）について	3
2	広島県の地図	8
3	平成27年度 保険種別比較（40-74歳）	9
4	平成28年度 保険種別比較（40-74歳）	20
5	平成27年度 年代別比較（協会けんぽ+国保）	31
6	平成28年度 年代別比較（協会けんぽ+国保）	42
7	平成27年度・平成28年度 経年比較（協会けんぽ+国保・40-74歳）	53
8	特定健診リスク因子一覧表	74
9	都道府県のマップ	77

市区町別特定健診リスク因子マップ（健診マップ）について

1 目的

本マップは、健診結果データを活用し、リスク因子（肥満、高血圧等）の状況を市区町別に地図上に表示することで「見える化」し、各保険者における保健事業の推進に活用いただくことを目的として作成しました。

2 使用したデータ

年 度	平成27年度、平成28年度
保険種別	全国健康保険協会広島支部（協会けんぽ）、市町国保、国保組合
対 象	40歳以上75歳未満の健診結果
人 数	平成27年度 男性 約177,000人、女性 約163,000人 平成28年度 男性 約173,000人、女性 約162,000人

3 データの出典

協会けんぽ	全国健康保険協会広島支部より指定した項目のデータを提供。
県内22市町、4国保組合 （広島市を除く）	国保データベース（KDB）システム 「厚生労働省様式（様式6-2～7）（S21-24）」
広 島 市	特定健診等データ管理システム「FKAC131」「FKAC167」

4 方法

健診結果データから保険種別，市区町別，性・年齢階級別に健診を受診した人数と基準値に該当した人数を取りまとめ，市区町別に標準化該当比（※1）を算出し，特定健診の検査項目ごとに県全体と比べて，高い（低い）のかを視覚的に比較できるようにしました。

なお，4国保組合については，住所地が特定できませんので，地図には反映していません。

※1 標準化該当比

県全体での有所見率（健診を受診した人数と，基準値に該当した人数の割合）を100としたときに，各市区町での有所見率を相対値で表したもので，健診の有所見率を年齢調整（※2）したうえで市区町間の比較ができるものです。県全体を100として，標準化該当比が100より大きい場合は有所見率が県より高く，100より小さい場合は有所見率が県より低いことを示します。

算出にあたっては，平成26年度厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）健診・医療・介護等データベースの活用による地区診断と保健事業の立案を含む生活習慣病対策事業を担う地域保健人材の育成に関する研究（研究代表：国立保健医療科学院 横山徹爾）の一環として作成された市区町村別標準化該当計算シートを使用しています。

※2 年齢調整

高齢者ほど高血圧の割合が高いことはよく知られています。A地区よりもB地区の方が高血圧者の割合が多かったとしても，B地区の方が高齢者の割合が多ければ，A地区よりもB地区の方が高齢者が多いので高血圧の人の割合が多くて当たり前とも考えられます。そこで，どちらの地区も年齢構成が同一であった場合として比較できるよう計算しています。

5 各検査項目及び基準値

検査項目		基準値	基準値を超えると、どのような危険に繋がるか (個人差があり、必ずなるものではありません)
肥満	BMI 体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)	≥25kg/m ²	高血圧症，糖尿病など生活習慣病の引き金となります
	腹囲 (内臓脂肪型肥満)	≥85cm (男性) ≥90cm (女性)	
高血圧	収縮期血圧	≥130mmHg	動脈硬化を進行させ，脳卒中や心臓病を引き起こします
	拡張期血圧	≥85mmHg	
糖尿病	空腹時血糖	≥100mg/dl	動脈硬化を進行させ，さまざまな合併症を引き起こします
	HbA1c	≥5.6%	
脂質異常症	中性脂肪	≥150mg/dl	動脈硬化を進行させます
	HDLコレステロール	<40mg/dl	
	LDLコレステロール	≥120mg/dl	
肝臓	ALT (GPT)	≥31IU/L	肝硬変，脂肪肝，肝臓がんなどを引き起こします

6 マップの比較等

各検査項目ごとのマップを、次のとおり比較することで、地域間の特徴を把握しやすいようにしました。
各保険者がお持ちの生活習慣関係のデータ等を併せて見ることで、地域における健康課題の傾向を把握する一助となるものと考えております。

種 類	
比較 1 - 1	平成27年度 保険種別比較（40-74歳） 協会けんぽと国保を比較しています
比較 1 - 2	平成28年度 保険種別比較（40-74歳） 協会けんぽと国保を比較しています
比較 2 - 1	平成27年度 年代別比較（協会けんぽ+国保） 40-64歳と65-74歳を比較しています
比較 2 - 2	平成28年度 年代別比較（協会けんぽ+国保） 40-64歳と65-74歳を比較しています
比較 3	平成27年度・平成28年度 経年比較（協会けんぽ+国保・40-74歳） 2年分を比較しています
比較 4	特定健診リスク因子一覧表 平成27年度・平成28年度（協会けんぽ+国保・40-74歳） 市区町別、国保組合別に各検査項目のリスクの高低を一覧にしています
参 考	平成27年度 都道府県のマップ 全国と広島県を比較しています ※ NDBオープンデータが平成27年度までの公表となっており、平成28年度分はありません。


7 読み取り方法

今回の分析においては、次の4段階に区分しました。

	有意に高い	広島県に比べて高い
	高いが有意でない	広島県に比べて高めだが偶然変動の範囲かもしれない
	低いが有意でない	広島県に比べて低めだが偶然変動の範囲かもしれない
	有意に低い	広島県に比べて低い

※ 有意とは

統計上、ある事象が起こる確率が偶然とは考えにくい（有意である）と判断する基準となる確率のことです。普通は5%（0.05），厳密を要する場合は1%（0.01）を使います。
今回は5%としています。



広島県の地図



平成27年度


保険種別比較（40-74歳）

BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$


協会けんぽ

国保

男性




BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性40-74歳] 協会けんぽ




BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性40-74歳] 国保

・協会けんぽ・国保ともに
呉市, 尾道市, 江田島市は,
有意に高い傾向にある

女性



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性40-74歳] 協会けんぽ



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性40-74歳] 国保



・協会けんぽ・国保ともに
呉市, 尾道市, 江田島市は,
有意に高い傾向にある

腹囲 ≥ 85 cm（男性） ・ 腹囲 ≥ 90 cm（女性）

協会けんぽ



国保

男 性



・ 協会けんぽ・国保ともに
呉市，尾道市は，有意に高
い傾向にある

女 性





・ 協会けんぽ・国保ともに
呉市，尾道市は，有意に高
い傾向にある

収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$

協会けんぽ



国保

男性



・協会けんぽの沿岸部は、有意に高い市町が多い傾向にある

女性




・協会けんぽ・国保ともに福山市、北広島町は、有意に高い傾向にある

拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$


協会けんぽ

国保

男性




拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [男性40-74歳] 協会けんぽ




拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [男性40-74歳] 国保

・協会けんぽの沿岸部は、有意に高い市町が多い傾向にある

女性



拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [女性40-74歳] 協会けんぽ



拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [女性40-74歳] 国保


・協会けんぽ・国保ともに三原市は、有意に高い傾向にある

空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$


協会けんぽ

国保

男性




空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ 【男性40-74歳】協会けんぽ




空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ 【男性40-74歳】国保

- ・協会けんぽ・国保ともに広島市安佐南区，三原市，庄原市，安芸高田市，安芸太田町は，有意に高い傾向にある
- ・北広島町は，協会けんぽは有意に高いが，国保は有意に低い傾向にある

女性



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ 【女性40-74歳】協会けんぽ



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ 【女性40-74歳】国保



- ・協会けんぽ・国保ともに広島市安佐南区，三原市，庄原市は，有意に高い傾向にある
- ・広島市安佐北区，北広島町は，協会けんぽは有意に高いが，国保は有意に低い傾向にある

HbA1c $\geq$ 5.6%

協会けんぽ



国保

男性

HbA1c $\geq$ 5.6%【男性40-74歳】協会けんぽHbA1c $\geq$ 5.6%【男性40-74歳】国保

- ・協会けんぽ・国保ともに広島市安佐南区，三次市，庄原市，北広島町は，有意に高い傾向にある
- ・尾道市は，協会けんぽは有意に高いが，国保は有意に低い傾向にある

女性

HbA1c $\geq$ 5.6%【女性40-74歳】協会けんぽHbA1c $\geq$ 5.6%【女性40-74歳】国保


- ・協会けんぽ・国保ともに三次市，安芸高田市，北広島町は，有意に高い傾向にある
- ・尾道市は，協会けんぽは有意に高いが，国保は有意に低い傾向にある

中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$


協会けんぽ

国保

男性




中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ 【男性40-74歳】協会けんぽ




中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ 【男性40-74歳】国保

・国保は、協会けんぽより有意に低い市町が多い傾向にある

女性



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ 【女性40-74歳】協会けんぽ



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ 【女性40-74歳】国保


・国保は、協会けんぽより有意に低い市町が多い傾向にある
・国保は、広島市周辺の市町が有意に高い傾向にある

HDLコレステロール<40mg/dl


協会けんぽ

国保

男性




HDLコレステロール<40mg/dl【男性40-74歳】協会けんぽ




HDLコレステロール<40mg/dl【男性40-74歳】国保

・協会けんぽ・国保ともに
尾道市、福山市は、有意に
高い傾向にある

女性



HDLコレステロール<40mg/dl【女性40-74歳】協会けんぽ



HDLコレステロール<40mg/dl【女性40-74歳】国保


・協会けんぽ・国保ともに
尾道市は、有意に高い傾向
にある

LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$


協会けんぽ

国保

男性




LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [男性40-74歳] 協会けんぽ




LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [男性40-74歳] 国保

・協会けんぽ・国保ともに
県北部は、有意に低い市町
が多い傾向にある

女性



LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [女性40-74歳] 協会けんぽ



LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [女性40-74歳] 国保


・協会けんぽ・国保ともに
福山市は、有意に高い傾向
にある

ALT（GPT） ≥ 31 U/L


協会けんぽ

国保

男性




ALT(GPT) ≥ 31 U/L [男性40-74歳] 協会けんぽ




ALT(GPT) ≥ 31 U/L [男性40-74歳] 国保

・協会けんぽ・国保ともに
三次市は、有意に高い傾向
にある

女性



ALT(GPT) ≥ 31 U/L [女性40-74歳] 協会けんぽ



ALT(GPT) ≥ 31 U/L [女性40-74歳] 国保

・協会けんぽ・国保ともに
庄原市は、有意に高い傾向
にある

平成28年度



保険種別比較（40-74歳）

BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$

協会けんぽ



国保

男性



・協会けんぽ・国保ともに
呉市, 尾道市, 大崎上島町
は, 有意に高い傾向にある

女性





・協会けんぽ・国保ともに
呉市, 尾道市, 江田島市は,
有意に高い傾向にある

腹囲 $\geq 85\text{cm}$ （男性），腹囲 $\geq 90\text{cm}$ （女性）

協会けんぽ



国保

男 性



・協会けんぽ・国保ともに
呉市，尾道市は，有意に高
い傾向にある

女 性




・協会けんぽ・国保ともに
呉市，尾道市は，有意に高
い傾向にある

収縮期血圧 ≥ 130 mmHg


協会けんぽ

国保

男性




収縮期血圧 ≥ 130 mmHg [男性40-74歳] 協会けんぽ




収縮期血圧 ≥ 130 mmHg [男性40-74歳] 国保

- ・協会けんぽ・国保ともに福山市，大竹市は，有意に高い傾向にある
- ・東広島市は，協会けんぽは有意に高いが，国保は有意に低い傾向にある

女性



収縮期血圧 ≥ 130 mmHg [女性40-74歳] 協会けんぽ



収縮期血圧 ≥ 130 mmHg [女性40-74歳] 国保


- ・協会けんぽ・国保ともに福山市は，有意に高い傾向にある
- ・東広島市は，協会けんぽは有意に高いが，国保は有意に低い傾向にある

拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$


協会けんぽ

国保

男性




拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [男性40-74歳] 協会けんぽ




拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [男性40-74歳] 国保

- ・協会けんぽ・国保ともに呉市は有意に高い傾向にある
- ・東広島市は、協会けんぽは有意に高いが、国保は有意に低い傾向にある

女性



拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [女性40-74歳] 協会けんぽ



拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [女性40-74歳] 国保


- ・協会けんぽ・国保ともに三原市、福山市は、有意に高い傾向にある
- ・広島市安佐南区は、協会けんぽは有意に低い、国保は有意に高い傾向にある

空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$


協会けんぽ

国保

男性




空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ [男性40-74歳] 協会けんぽ




空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ [男性40-74歳] 国保

・協会けんぽ・国保ともに
県北部は、有意に高い市町
が多い傾向にある

女性



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ [女性40-74歳] 協会けんぽ



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ [女性40-74歳] 国保


・協会けんぽ・国保ともに
県北部は、有意に高い市町
が多い傾向にある
・大竹市、東広島市は、協
会けんぽは有意に低いが、
国保は有意に高い傾向にあ
る

HbA1c $\geq$ 5.6%


協会けんぽ

国保

男性




HbA1c $\geq$ 5.6% [男性40-74歳] 協会けんぽ




HbA1c $\geq$ 5.6% [男性40-74歳] 国保

- ・協会けんぽ・国保ともに広島市西区、安佐南区、安佐北区、三次市、世羅町は、有意に高い傾向にある
- ・尾道市は、協会けんぽは有意に高いが、国保は有意に低い傾向にある

女性



HbA1c $\geq$ 5.6% [女性40-74歳] 協会けんぽ



HbA1c $\geq$ 5.6% [女性40-74歳] 国保


- ・協会けんぽ・国保ともに広島市西区、安佐南区、三次市、北広島町、世羅町は、有意に高い傾向にある
- ・広島市南区、海田町は、協会けんぽは有意に低い、国保は有意に高い傾向にある

中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$


協会けんぽ

国保

男性




中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ 【男性40-74歳】協会けんぽ




中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ 【男性40-74歳】国保

・広島市安佐北区は、協会けんぽは低いですが、国保は高い傾向にある

女性



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ 【女性40-74歳】協会けんぽ



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ 【女性40-74歳】国保


・協会けんぽ・国保ともに福山市は、有意に高い傾向にある

HDLコレステロール<40mg/dl


協会けんぽ

国保

男性




HDLコレステロール<40mg/dl [男性40-74歳] 協会けんぽ




HDLコレステロール<40mg/dl [男性40-74歳] 国保

・協会けんぽ・国保ともに
尾道市，福山市，府中市は、
有意に高い傾向にある

女性



HDLコレステロール<40mg/dl [女性40-74歳] 協会けんぽ



HDLコレステロール<40mg/dl [女性40-74歳] 国保


・協会けんぽ・国保ともに
尾道市，福山市は、有意に
高い傾向にある

LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$


協会けんぽ

国保

男性




LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [男性40-74歳] 協会けんぽ




LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [男性40-74歳] 国保

・協会けんぽ・国保ともに
県北部は、有意に低い市町
が多い傾向にある

女性



LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [女性40-74歳] 協会けんぽ



LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [女性40-74歳] 国保



・協会けんぽ・国保ともに
安芸高田市、北広島町は、
有意に低い傾向にある

ALT (GPT) ≥ 31 U/L

協会けんぽ



国保

男性



- ・協会けんぽ・国保ともに三次市は、有意に高い傾向にある
- ・呉市は、協会けんぽは有意に高いが、国保は有意に低い傾向にある

女性



- ・協会けんぽ・国保ともに広島市東区は、有意に低い傾向にある

平成27年度


年代別比較（協会けんぽ＋国保）

BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$


40-64歳

65-74歳

男性




BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

・ いずれの年代も呉市, 尾道市は, 有意に高い傾向にある

女性



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保



・ いずれの年代も呉市, 竹原市, 尾道市, 福山市は, 有意に高い傾向にある

腹囲 ≥ 85 cm（男性），腹囲 ≥ 90 cm（女性）

40-64歳



65-74歳

男性



・ いずれの年代も呉市，尾道市は有意に高い傾向にある

女性




・ いずれの年代も呉市，尾道市，福山市は，有意に高い傾向にある

収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$


40-64歳

65-74歳

男性




収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【男性40-64歳】協会けんぽ+国保




収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【男性65-74歳】協会けんぽ+国保

・沿岸部の40-64歳は、有意に高い市町が多い傾向がある

女性



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【女性40-64歳】協会けんぽ+国保



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【女性65-74歳】協会けんぽ+国保


・いずれの年代も福山市、神石高原町は、有意に高い傾向にある

拡張期血圧 ≥ 85 mmHg


40-64歳

65-74歳

男性




拡張期血圧 ≥ 85 mmHg [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




拡張期血圧 ≥ 85 mmHg [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

・ いずれの年代も呉市は、
有意に高い傾向にある

女性



拡張期血圧 ≥ 85 mmHg [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



拡張期血圧 ≥ 85 mmHg [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


・ いずれの年代も三原市は、
有意に高い傾向にある。

空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$


40-64歳

65-74歳

男性




空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 男性40-64歳 | 協会けんぽ+国保




空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 男性65-74歳 | 協会けんぽ+国保

・ いずれの年代も広島市中区、東区、西区、安佐南区、三原市、庄原市、安芸高田市、安芸太田町は、有意に高い傾向にある

女性



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 女性40-64歳 | 協会けんぽ+国保



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 女性65-74歳 | 協会けんぽ+国保


・ いずれの年代も広島市安佐南区、竹原市、三原市、三次市、庄原市は高い傾向にある
広島市安佐北区、北広島町は、40-64歳は有意に高いが65-74歳は有意に低い傾向にある

HbA1c $\geq$ 5.6%


40-64歳

65-74歳

男性




HbA1c $\geq$ 5.6% [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




HbA1c $\geq$ 5.6% [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

・いずれの年代も広島市中区、西区、安佐南区、三次市、庄原市、安芸高田市、北広島町は、有意に高い傾向にある

女性



HbA1c $\geq$ 5.6% [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



HbA1c $\geq$ 5.6% [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


・いずれの年代も広島市中区、西区、佐伯区、三次市、庄原市、東広島市、安芸高田市、北広島町は有意に高い傾向にある

中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$


40-64歳

65-74歳

男性




中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

・ いずれの年代も府中市，東広島市は，有意に低い傾向にある

女性



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保



・ いずれの年代も三原市，三次市，庄原市，安芸高田市，大崎上島町は，有意に低い傾向にある

HDLコレステロール<40mg/dl

40-64歳

65-74歳

男性





・いずれの年代も尾道市、
福山市は、有意に高い傾向
にある

HDLコレステロール<40mg/dl [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保

HDLコレステロール<40mg/dl [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

女性



・いずれの年代も尾道市は、
有意に高い傾向にある

HDLコレステロール<40mg/dl [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



HDLコレステロール<40mg/dl [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保

LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$

40-64歳

65-74歳

男性





・ いずれの年代も県北部は、
有意に低い市町が多い傾向
にある

LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保

LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

女性



・ いずれの年代も福山市は、
有意に高い傾向にある

LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保


LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保

ALT (GPT) ≥ 31 U/L


40-64歳

65-74歳

男性




ALT(GPT) ≥ 31 U/L [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




ALT(GPT) ≥ 31 U/L [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

・ いずれの年代も三次市は、
有意に高い傾向にある

女性



ALT(GPT) ≥ 31 U/L [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



ALT(GPT) ≥ 31 U/L [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保

・ いずれの年代も庄原市は、
有意に高い傾向にある

平成28年度


年代別比較（協会けんぽ＋国保）

BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$


40-64歳

65-74歳

男性




BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

・ いずれの年代も呉市, 尾道市は, 有意に高い傾向にある

女性



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


・ いずれの年代も呉市, 尾道市, 福山市は, 有意に高い傾向にある

腹囲 ≥ 85 cm（男性），腹囲 ≥ 90 cm（女性）


40-64歳

65-74歳

男性




腹囲 ≥ 85 cm【男性40-64歳】協会けんぽ+国保




腹囲 ≥ 85 cm【男性65-74歳】協会けんぽ+国保

- ・ いずれの年代も呉市，尾道市は，有意に高い傾向にある
- ・ 東広島市は，40-64歳は有意に高いが，65-74歳は有意に低い傾向にある

女性



腹囲 ≥ 90 cm【女性40-64歳】協会けんぽ+国保



腹囲 ≥ 90 cm【女性65-74歳】協会けんぽ+国保


- ・ いずれの年代も呉市，尾道市，福山市は，有意に高い傾向にある

収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$


40-64歳

65-74歳

男性




収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【男性40-64歳】協会けんぽ+国保




収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【男性65-74歳】協会けんぽ+国保

- ・ いずれの年代も福山市は、有意に高い傾向にある
- ・ 東広島市は、40-64歳は有意に高いが、65-74歳は有意に低い傾向にある

女性



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【女性40-64歳】協会けんぽ+国保



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【女性65-74歳】協会けんぽ+国保


- ・ いずれの年代も福山市は、有意に高い傾向にある

拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$


40-64歳

65-74歳

男性




拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

- ・ いずれの年代も呉市は、高い傾向にある
- ・ 東広島市は、40-64歳は有意に高いが、65-74歳は有意に低い傾向にある

女性



拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


- ・ いずれの年代も三原市は、有意に高い傾向にある
- ・ 広島市安佐南区は、40-64歳は有意に低い、65-74歳は有意に高い傾向にある

空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$


40-64歳

65-74歳

男性




空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 男性40-64歳 | 協会けんぽ+国保




空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 男性65-74歳 | 協会けんぽ+国保

- ・ いずれの年代も広島市安佐北区、竹原市、三原市、三次市、庄原市、安芸高田市、安芸太田町、世羅町は、有意に高い傾向にある
- ・ 北広島町は、40-64歳は、有意に高いが、65-74歳は有意に低い傾向にある

女性



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 女性40-64歳 | 協会けんぽ+国保



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 女性65-74歳 | 協会けんぽ+国保


- ・ いずれの年代も三原市、三次市、庄原市、安芸高田市は、有意に高い傾向にある
- ・ 大竹市は、40-64歳は、有意に低い、65-74歳は有意に高い傾向にある
- ・ 北広島町は、40-64歳は、有意に高いが、65-74歳は有意に低い傾向にある

HbA1c $\geq$ 5.6%


40-64歳

65-74歳

男性




HbA1c $\geq$ 5.6% [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




HbA1c $\geq$ 5.6% [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

・いずれの年代も広島市東区、西区、安佐南区、佐伯区、竹原市、三次市、庄原市、世羅町は、有意に高い傾向にある

女性



HbA1c $\geq$ 5.6% [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



HbA1c $\geq$ 5.6% [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


・いずれの年代も広島市中区、東区、西区、安佐南区、佐伯区、三次市、庄原市、東広島市、安芸高田市、北広島町、世羅町は、有意に高い傾向にある

中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$


40-64歳

65-74歳

男性




中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

・広島市安佐北区は、40-64歳は有意に低い、65-74歳は有意に高い傾向にある

女性



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保



・いずれの年代も福山市は、有意に高い傾向にある
・広島市安佐南区は、40-64歳は有意に低い、65-74歳は有意に高い傾向にある

HDLコレステロール<40mg/dl

40-64歳

65-74歳

男性





・いずれの年代も尾道市、
福山市、府中市は、有意に
高い傾向にある

HDLコレステロール<40mg/dl [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保

HDLコレステロール<40mg/dl [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

女性



・いずれの年代も尾道市、
福山市は、有意に高い傾向
にある

HDLコレステロール<40mg/dl [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保


HDLコレステロール<40mg/dl [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保

LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$


40-64歳

65-74歳

男性




LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

・ いずれの年代も尾道市、
庄原市、安芸高田市、北広
島町は、有意に低い傾向に
ある

女性



LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


・ いずれの年代も安芸高田
市は、有意に低い傾向にあ
る

ALT (GPT) ≥ 31 U/L


40-64歳

65-74歳

男性




ALT(GPT) ≥ 31 U/L [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




ALT(GPT) ≥ 31 U/L [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

・ いずれの年代も三次市は、有意に高い傾向にある

女性



ALT(GPT) ≥ 31 U/L [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



ALT(GPT) ≥ 31 U/L [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保

・ いずれの年代も広島市東区、西区は有意に低い傾向にある

比較 3

平成27年度・平成28年度 経年比較 (協会けんぽ＋国保)


BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ （男性）

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性40-74歳] 協会けんぽ+国保




BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保


平成28年度



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性40-74歳] 協会けんぽ+国保



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保


BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ （女性）

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保




BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性40-74歳] 協会けんぽ+国保




BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


平成28年度



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性40-74歳] 協会けんぽ+国保



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保




腹囲 ≥ 85 cm（男性）

40-64歳




40-74歳

65-74歳

平成27年度



平成28年度






腹囲 ≥ 90 cm（女性）

40-64歳




40-74歳

65-74歳

平成27年度



平成28年度




収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ （男性）

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【男性40-64歳】協会けんぽ+国保




収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【男性40-74歳】協会けんぽ+国保




収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【男性65-74歳】協会けんぽ+国保


平成28年度



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【男性40-64歳】協会けんぽ+国保



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【男性40-74歳】協会けんぽ+国保



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【男性65-74歳】協会けんぽ+国保


収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ （女性）

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【女性40-64歳】協会けんぽ+国保




収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【女性40-74歳】協会けんぽ+国保




収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【女性65-74歳】協会けんぽ+国保


平成28年度



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【女性40-64歳】協会けんぽ+国保



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【女性40-74歳】協会けんぽ+国保



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ 【女性65-74歳】協会けんぽ+国保


拡張期血圧 ≥ 85 mmHg（男性）

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



拡張期血圧 ≥ 85 mmHg【男性40-64歳】協会けんぽ+国保




拡張期血圧 ≥ 85 mmHg【男性40-74歳】協会けんぽ+国保




拡張期血圧 ≥ 85 mmHg【男性65-74歳】協会けんぽ+国保


平成28年度



拡張期血圧 ≥ 85 mmHg【男性40-64歳】協会けんぽ+国保



拡張期血圧 ≥ 85 mmHg【男性40-74歳】協会けんぽ+国保



拡張期血圧 ≥ 85 mmHg【男性65-74歳】協会けんぽ+国保


拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ （女性）

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保




拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [女性40-74歳] 協会けんぽ+国保




拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


平成28年度



拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [女性40-74歳] 協会けんぽ+国保



拡張期血圧 $\geq 85\text{mmHg}$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ （男性）

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 男性40-64歳 | 協会けんぽ+国保




空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 男性40-74歳 | 協会けんぽ+国保




空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 男性65-74歳 | 協会けんぽ+国保


平成28年度



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 男性40-64歳 | 協会けんぽ+国保



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 男性40-74歳 | 協会けんぽ+国保



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 男性65-74歳 | 協会けんぽ+国保


空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ （女性）

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 〔女性40-64歳〕 協会けんぽ+国保




空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 〔女性40-74歳〕 協会けんぽ+国保




空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 〔女性65-74歳〕 協会けんぽ+国保


平成28年度



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 〔女性40-64歳〕 協会けんぽ+国保



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 〔女性40-74歳〕 協会けんぽ+国保



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ | 〔女性65-74歳〕 協会けんぽ+国保


HbA1c $\geq$ 5.6%（男性）

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



HbA1c $\geq$ 5.6% [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




HbA1c $\geq$ 5.6% [男性40-74歳] 協会けんぽ+国保




HbA1c $\geq$ 5.6% [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保


平成28年度



HbA1c $\geq$ 5.6% [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保



HbA1c $\geq$ 5.6% [男性40-74歳] 協会けんぽ+国保



HbA1c $\geq$ 5.6% [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保


HbA1c $\geq$ 5.6%（女性）

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



HbA1c $\geq$ 5.6% [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保




HbA1c $\geq$ 5.6% [女性40-74歳] 協会けんぽ+国保




HbA1c $\geq$ 5.6% [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


平成28年度



HbA1c $\geq$ 5.6% [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



HbA1c $\geq$ 5.6% [女性40-74歳] 協会けんぽ+国保



HbA1c $\geq$ 5.6% [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ （男性）

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [男性40-74歳] 協会けんぽ+国保




中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保


平成28年度



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [男性40-74歳] 協会けんぽ+国保



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保


中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ （女性）

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保




中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [女性40-74歳] 協会けんぽ+国保




中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


平成28年度



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [女性40-74歳] 協会けんぽ+国保



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保




HDLコレステロール<40mg/dl（男性）

40-64歳

40-74歳

65-74歳

平成27年度






HDLコレステロール<40mg/dl [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保

HDLコレステロール<40mg/dl [男性40-74歳] 協会けんぽ+国保

HDLコレステロール<40mg/dl [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保

平成28年度



HDLコレステロール<40mg/dl [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保

HDLコレステロール<40mg/dl [男性40-74歳] 協会けんぽ+国保

HDLコレステロール<40mg/dl [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保




HDLコレステロール<40mg/dl（女性）

40-64歳

40-74歳

65-74歳

平成27年度






HDLコレステロール<40mg/dl [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保

HDLコレステロール<40mg/dl [女性40-74歳] 協会けんぽ+国保

HDLコレステロール<40mg/dl [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保

平成28年度



HDLコレステロール<40mg/dl [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保

HDLコレステロール<40mg/dl [女性40-74歳] 協会けんぽ+国保

HDLコレステロール<40mg/dl [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保




LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ （男性）

40-64歳




40-74歳

65-74歳

平成27年度



平成28年度






LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ （女性）

40-64歳

40-74歳

65-74歳

平成27年度






LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ 〔女性40-64歳〕協会けんぽ+国保

LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ 〔女性40-74歳〕協会けんぽ+国保

LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ 〔女性65-74歳〕協会けんぽ+国保

平成28年度



LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ 〔女性40-64歳〕協会けんぽ+国保

LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ 〔女性40-74歳〕協会けんぽ+国保

LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ 〔女性65-74歳〕協会けんぽ+国保


ALT (GPT) ≥ 31 U/L (男性)

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



ALT(GPT) ≥ 31 IU/L [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保




ALT(GPT) ≥ 31 IU/L [男性40-74歳] 協会けんぽ+国保




ALT(GPT) ≥ 31 IU/L [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保


平成28年度



ALT(GPT) ≥ 31 IU/L [男性40-64歳] 協会けんぽ+国保



ALT(GPT) ≥ 31 IU/L [男性40-74歳] 協会けんぽ+国保



ALT(GPT) ≥ 31 IU/L [男性65-74歳] 協会けんぽ+国保


ALT (GPT) ≥ 31 U/L (女性)

40-64歳


40-74歳

65-74歳


平成27年度



ALT(GPT) ≥ 31 IU/L [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保




ALT(GPT) ≥ 31 IU/L [女性40-74歳] 協会けんぽ+国保




ALT(GPT) ≥ 31 IU/L [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保


平成28年度



ALT(GPT) ≥ 31 IU/L [女性40-64歳] 協会けんぽ+国保



ALT(GPT) ≥ 31 IU/L [女性40-74歳] 協会けんぽ+国保



ALT(GPT) ≥ 31 IU/L [女性65-74歳] 協会けんぽ+国保

特定健診リスク因子一覧表

（協会けんぽ＋国保・40-74歳）

平成27年度 特定健診リスク因子一覧表

男性（40-74歳）

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	血糖	HbA1c	中性脂肪	HDL	LDL	ALT
広島市	中区										
	東区										
	南区										
	西区										
	安佐南区										
	安佐北区										
	安芸区										
	佐伯区										
	呉市										
	竹原市										
	三原市										
	尾道市										
	福山市										
	府中市										
	三次市										
	庄原市										
	大竹市										
	東広島市										
	廿日市市										
	安芸高田市										
	江田島市										
	府中町										
	海田町										
	熊野町										
	坂町										
	安芸太田町										
	北広島町										
	大崎上島町										
	世羅町										
	神石高原町										
	歯科医師国保										
	医師国保										
	薬剤師国保										
	建設国保										

女性（40-74歳）

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	血糖	HbA1c	中性脂肪	HDL	LDL	ALT
広島市	中区										
	東区										
	南区										
	西区										
	安佐南区										
	安佐北区										
	安芸区										
	佐伯区										
	呉市										
	竹原市										
	三原市										
	尾道市										
	福山市										
	府中市										
	三次市										
	庄原市										
	大竹市										
	東広島市										
	廿日市市										
	安芸高田市										
	江田島市										
	府中町										
	海田町										
	熊野町										
	坂町										
	安芸太田町										
	北広島町										
	大崎上島町										
	世羅町										
	神石高原町										
	歯科医師国保										
	医師国保										
	薬剤師国保										
	建設国保										

平成28年度 特定健診リスク因子一覧表

男 性（40-74歳）

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	血糖	HbA1c	中性脂肪	HDL	LDL	ALT
広島市	中区										
	東区										
	南区										
	西区										
	安佐南区										
	安佐北区										
	安芸区										
	佐伯区										
呉市											
竹原市											
三原市											
尾道市											
福山市											
府中市											
三次市											
庄原市											
大竹市											
東広島市											
廿日市市											
安芸高田市											
江田島市											
府中町											
海田町											
熊野町											
坂町											
安芸太田町											
北広島町											
大崎上島町											
世羅町											
神石高原町											
歯科医師国保											
医師国保											
薬剤師国保											
建設国保											

女 性（40-74歳）

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	血糖	HbA1c	中性脂肪	HDL	LDL	ALT
広島市	中区										
	東区										
	南区										
	西区										
	安佐南区										
	安佐北区										
	安芸区										
	佐伯区										
呉市											
竹原市											
三原市											
尾道市											
福山市											
府中市											
三次市											
庄原市											
大竹市											
東広島市											
廿日市市											
安芸高田市											
江田島市											
府中町											
海田町											
熊野町											
坂町											
安芸太田町											
北広島町											
大崎上島町											
世羅町											
神石高原町											
歯科医師国保											
医師国保											
薬剤師国保											
建設国保											

平成27年度

都道府県のマッヅ（40-74歳）

1 方法

平成27年度のNDBオープンデータを基に、都道府県別、性・年齢階級別に、健診を受診した人数と、基準値に該当した人数を取りまとめ、国立保健医療科学院が開発したツールにより都道府県別に標準化該当比（※）を算出し、特定健診の検査項目ごとに全国と比べて、高い（低い）のかを視覚的に比較できるようにしました。


※ 標準化該当比

全国での有所見率を100としたときに、都道府県での有所見率を相対値で表したもので、健診の有所見率を年齢調整したうえで都道府県間の比較ができるものです。全国を100として、標準化該当比が100より大きい場合は有所見率が全国より高く、100より小さい場合は有所見率が全国より低いことを示します。

2 読み取り方法

広島県の分析と同様に、4段階に区分しました。

	有意に高い	全国に比べて高い
	高いが有意でない	全国に比べて高めだが偶然変動の範囲かもしれない
	低いが有意でない	全国に比べて低めだが偶然変動の範囲かもしれない
	有意に低い	全国に比べて低い




BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ （都道府県比較・40-74歳）


都道府県

男 性

女 性



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [男性40-74歳]NDB



BMI $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$ [女性40-74歳]NDB


- 広島県の男性のBMIは、全国と比較して有意に低い傾向にある
- 広島県の女性のBMIは、全国と比較して有意に低い傾向にある

腹囲 ≥ 85 cm（都道府県比較・40-74歳）


都道府県

男 性

女 性



腹囲 ≥ 85 cm [男性40-74歳]NDB



腹囲 ≥ 90 cm [女性40-74歳]NDB


- 広島県の男性の腹囲は、全国と比較して有意に高い傾向にある
- 広島県の女性の腹囲は、全国と比較して有意に高い傾向にある

収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ （都道府県比較・40-74歳）


都道府県

男性

女性



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ [男性40-74歳] NDB



収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$ [女性40-74歳] NDB


- 広島県の男性の収縮期血圧は、全国と比較して有意に高い傾向にある
- 広島県の女性の収縮期血圧は、全国と比較して低い有意でない傾向にある

拡張期血圧 ≥ 85 mmHg（都道府県比較・40-74歳）


都道府県

男性

女性



拡張期血圧 ≥ 85 mmHg [男性40-74歳]NDB



拡張期血圧 ≥ 85 mmHg [女性40-74歳]NDB


- 広島県の男性の拡張期血圧は、全国と比較して有意に高い傾向にある
- 広島県の女性の拡張期血圧は、全国と比較して低い有意でない傾向にある

空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ （都道府県比較・40-74歳）


都道府県

男性

女性



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ [男性40-74歳]NDB



空腹時血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ [女性40-74歳]NDB


- 広島県の男性の空腹時血糖は、全国と比較して有意に高い傾向にある
- 広島県の女性の空腹時血糖は、全国と比較して有意に高い傾向にある

HbA1c $\geq$ 5.6%（都道府県比較・40-74歳）


都道府県

男性

女性



HbA1c $\geq$ 5.6% [男性40-74歳]NDB



HbA1c $\geq$ 5.6% [女性40-74歳]NDB


- 広島県の男性のHbA1cは、全国と比較して低い有意でない傾向にある
- 広島県の女性のHbA1cは、全国と比較して有意に低い傾向にある

中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ （都道府県比較・40-74歳）


都道府県

男性

女性



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [男性40-74歳]NDB



中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ [女性40-74歳]NDB


- 広島県の男性の中性脂肪は、全国と比較して高いが有意ではない傾向にある
- 広島県の女性の中性脂肪は、全国と比較して有意に高い傾向にある

HDLコレステロール<40mg/dl（都道府県比較・40-74歳）


都道府県

男性

女性



HDL <40mg/dl [男性40-74歳]NDB



HDL <40mg/dl [女性40-74歳]NDB


- 広島県の男性のHDLコレステロールは、全国と比較して有意に低い傾向にある
- 広島県の女性のHDLコレステロールは、全国と比較して有意に低い傾向にある

LDLコレステロール $\geq 120\text{mg/dl}$ （都道府県比較・40-74歳）


都道府県

男性

女性



LDL $\geq 120\text{mg/dl}$ [男性40-74歳]NDB



LDL $\geq 120\text{mg/dl}$ [女性40-74歳]NDB


- 広島県の男性のLDLコレステロールは、全国と比較して有意に高い傾向にある
- 広島県の女性のLDLコレステロールは、全国と比較して有意に高い傾向にある

ALT(GPT)≥31U/l（都道府県比較・40-74歳）


都道府県

男性

女性



ALT(GPT)≥31U/l [男性40-74歳]NDB



ALT(GPT)≥31U/l [女性40-74歳]NDB

- 広島県の男性のALTは、全国と比較して有意に高い傾向にある
- 広島県の女性のALTは、全国と比較して高いが有意でない傾向にある